

سانس کی وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی سفارشات

سانس کی بیماریوں کی ویکسینیں شدید بیماری، ہسپتال میں داخلے اور موت سے تحفظ فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں



COVID-19	ریسپائریٹری سنسیٹیشنل وائرس (RSV)	انفلونزا (فلو)	
23-6 ماہ کی عمر کے تمام کم عمر بچے اور 2-18 سال کی عمر کے بچے جو مخصوص خطرے والے گروہوں میں شامل ہوں یا اگر چاہیں	تمام شیر خوار بچے >8 ماہ، اگر حمل کے دوران RSV ویکسین سے تحفظ حاصل نہ ہوا ہو، اور 8-19 ماہ کی عمر کے بچے جو مخصوص خطرے والے گروہوں میں شامل ہوں	6 ماہ اور اس سے زیادہ عمر کے تمام بچوں کے لیے سالانہ فلو ویکسین	بچے اور نوعمر افراد (0-18 سال)
سالانہ اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 ویکسین	پہلی اہل حمل کے دوران ایک مرتبہ RSV ویکسین، اگر حمل کے 32-36 ہفتے ہوں، جو 1 ستمبر سے 1 مارچ کے درمیان دی جائے	سالانہ فلو ویکسین (ناک کے ذریعے دی جانے والی فلو ویکسین سے گریز کریں)	حمل
سالانہ اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 ویکسین	شدید RSV کے بڑھتے ہوئے خطرے والے 50-74 سال کی عمر کے بالغ افراد کے لیے ایک مرتبہ RSV ویکسین	19 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام بالغ افراد کے لیے سالانہ فلو ویکسین	بالغ افراد 19-64 سال
65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بالغ افراد کے لیے سالانہ اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 ویکسین، اس کے بعد تحفظ کو بڑھانے کے لیے 6 ماہ بعد دوسری خوراک۔	50-74 سال کی عمر کے شدید RSV کے بڑھتے ہوئے خطرے والے بالغ افراد اور 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام بالغ افراد کے لیے ایک مرتبہ RSV ویکسین کی سفارش کی جاتی ہے	تمام بالغ افراد کے لیے سالانہ فلو ویکسین، اور اگر ممکن ہو تو 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے بہتر فلو ویکسین (زیادہ خوراک، ایڈجوائنٹ، ریکومبیننٹ، یا mRNA)	معمّر افراد 65 سال اور اس سے زیادہ عمر
6 ماہ اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے سالانہ اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 ویکسین	18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے RSV ویکسین کی ایک خوراک، جبکہ >18 سال سے کم عمر افراد کے لیے ویکسین دینے کا فیصلہ مشترکہ مشاورت سے کیا جانا چاہیے	6 ماہ اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے سالانہ فلو ویکسین (ناک کے ذریعے دی جانے والی فلو ویکسین سے گریز کریں)	کمزور مدافعتی نظام والے افراد
سالانہ اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 ویکسین	عمر اور خطرے کی بنیاد پر RSV ویکسین کی سفارشات پر عمل کریں	سالانہ فلو ویکسین	طبی نگہداشت کا عملہ

آخری بار اپ ڈیٹ شدہ: 09/26

ویکسین کی دستیابی اور ان عمر کے افراد کے بارے میں معلومات کے لیے جنہیں وہ ویکسین دے سکتے ہیں، اپنی فارمیسی یا طبی نگہداشت فراہم کرنے والے سے رابطہ کریں۔ بہت سے معاملات میں، یہ ویکسین ایک ہی وقت میں دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو طبی نگہداشت فراہم کرنے والے، فارماسسٹ یا اپنے مقامی محکمہ صحت سے بات کریں۔

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH

vdh.virginia.gov/epidemiology/respiratory-diseases-in-virginia/

