

Khuyến nghị tiêm vắc xin phòng bệnh vi-rút đường hô hấp



**Vắc xin phòng bệnh đường hô hấp giúp bảo vệ
khỏi tình trạng bệnh nặng, nhập viện và tử vong**

	Cúm	Vi-rút hợp bào hô hấp (RSV)	COVID-19
 Trẻ em và thanh thiếu niên (0–18 tuổi)	Tiêm vắc xin cúm hàng năm cho tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên	Tất cả trẻ sơ sinh dưới 8 tháng tuổi nếu không được bảo vệ từ vắc xin RSV trong thai kỳ của mẹ, và trẻ từ 8–19 tháng tuổi thuộc một số nhóm nguy cơ nhất định	Tất cả trẻ nhỏ từ 6–23 tháng tuổi và trẻ từ 2–18 tuổi thuộc một số nhóm nguy cơ nhất định hoặc nếu có nhu cầu
 Thai kỳ	Tiêm vắc-xin cúm hàng năm (tránh dùng vắc-xin cúm dạng xịt mũi)	Tiêm vắc-xin RSV một lần trong thai kỳ đầu tiên đủ điều kiện nếu thai được 32–36 tuần, tiêm trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 1 tháng 3	Tiêm vắc-xin COVID-19 cập nhật hàng năm
 Người trưởng thành 19–64 tuổi	Tiêm vắc-xin cúm hàng năm cho tất cả người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên	Tiêm vắc-xin RSV một lần cho người trưởng thành từ 50–74 tuổi có nguy cơ mắc RSV nghiêm trọng cao hơn	Tiêm vắc-xin COVID-19 cập nhật hàng năm
 Người cao tuổi 65 tuổi trở lên	Tiêm vắc-xin cúm hàng năm cho tất cả người trưởng thành, ưu tiên vắc-xin cúm tăng cường (liều cao, có chất bổ trợ, tái tổ hợp hoặc mRNA) cho người từ 65 tuổi trở lên nếu có thể	Khuyến dùng vắc-xin RSV một lần cho người trưởng thành từ 50–74 tuổi có nguy cơ cao và tất cả người trưởng thành từ 75 tuổi trở lên	Tiêm vắc-xin COVID-19 cập nhật hàng năm cho người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên, sau đó tiêm liều thứ hai sau 6 tháng để tăng cường bảo vệ
 Người bị suy giảm miễn dịch	Tiêm vắc-xin cúm hàng năm cho người từ 6 tháng tuổi trở lên (tránh dùng vắc-xin cúm dạng xịt mũi)	Tiêm một liều vắc-xin RSV cho người từ 18 tuổi trở lên; đối với người dưới 18 tuổi, việc tiêm chủng nên dựa trên sự bàn bạc và quyết định chung giữa bác sĩ và người bệnh	Tiêm vắc-xin COVID-19 cập nhật hàng năm cho người từ 6 tháng tuổi trở lên
 Nhân viên y tế	Tiêm vắc-xin cúm hàng năm	Tuân thủ khuyến nghị tiêm vắc-xin RSV theo độ tuổi và mức độ nguy cơ	Tiêm vắc-xin COVID-19 cập nhật hàng năm



Hãy gọi cho nhà thuốc hoặc cơ sở y tế để xác nhận tình trạng có sẵn của vắc-xin và độ tuổi họ có thể tiêm chủng. Trong nhiều trường hợp, các loại vắc-xin này có thể được tiêm cùng một lúc. Nếu bạn có thắc mắc, hãy trao đổi với cơ sở y tế, dược sĩ hoặc cơ quan y tế địa phương.



vdh.virginia.gov/epidemiology/respiratory-diseases-in-virginia/

cập nhật lần cuối: 09/26

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH