

LAS GARRAPATAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS EN VIRGINIA

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE GARRAPATAS

Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras) (*Ixodes scapularis*)

(af) (am) (n) (l)

Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria") (*Amblyomma americanum*)

(af) (am) (n) (l)

American Dog Tick (Garrapata americana del perro) (*Dermacentor variabilis*)

(af) (am) (n) (l)

(af) = hembra adulta (am) = macho adulto (n) = ninfa (l) = larva

= Mayor transmisión de enfermedades.

= Etapa de la garrapata en la que pica a los humanos.

TAMAÑO REAL DE LAS GARRAPATAS

Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras)




Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")



American Dog Tick (Garrapata americana del perro)



ÉPOCAS DEL AÑO EN QUE LAS GARRAPATAS ESTÁN ACTIVAS EN VIRGINIA



*Se sabe que la garrapata americana del perro solo pica a los humanos en su etapa adulta.

TABLA DE ESPECIES DE GARRAPATAS Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS

Enfermedad o afección	Tipos de garrapatas vector	Etapa(s) en que la garrapata transmite la enfermedad	Periodo de incubación***
Síndrome de alfa-gal	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Larva, ninfa, adulta	Desconocido
Anaplasmosis	Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras)	Ninfa, adulta	7-14 días
Babesiosis	Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras)	Ninfa, adulta	De 1 semana a meses
Enfermedad por Borrelia miyamotoi	Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras)	Larva, ninfa, adulta	De 3 días a 6 semanas
Ehrlichiosis	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Ninfa, adulta	7-14 días
Virus Heartland	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Ninfa, adulta	De 3 días a 2 semanas
Enfermedad de Lyme	Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras)	Ninfa, adulta	3-30 días
Virus Powassan	Blacklegged Tick (Garrapata de patas negras)	Ninfa, adulta	1-4 semanas
Enfermedad por Rickettsia parkeri	Gulf Coast Ticks (Garrapata de la costa del Golfo) ¹	Adulta	2-10 días
	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Larva, ninfa, adulta	
Fiebre manchada de las Montañas	American Dog Tick (Garrapata americana del perro)	Adulta	2-14 días
	Brown Dog Ticks (Garrapa marrón del perro) ²	Ninfa, adulta	
	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Larva, ninfa, adulta	
Enfermedad cutánea asociada a la garrapata del sur (STARI, por sus siglas en inglés)	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Ninfa, adulta	1-7 días
Tularemia	Garrapata americana del perro	Adulta	1-14 días
	Lone Star Tick (Garrapata "estrella solitaria")	Ninfa, adulta	

*****Periodo de incubación y enfermedad:** El periodo de incubación es el tiempo que tardan en aparecer los síntomas después de que una persona se haya infectado. Para más información sobre los síntomas de estas enfermedades transmitidas por garrapatas, visite www.vdh.virginia.gov/ticks.

No olvide informar a su médico de cualquier exposición a garrapatas que haya tenido, sobre todo si experimenta algún síntoma después de la picadura.

Si necesita ayuda para identificar las garrapatas, puede participar en la encuesta del Departamento de Salud de Virginia sobre garrapatas. Puede encontrar más información sobre esta encuesta en <https://www.vdh.virginia.gov/ticks/tick-identification/virginia-tick-survey/>



¹**Gulf Coast Ticks (Garrapata de la costa del Golfo):** Estas garrapatas se encuentran esporádicamente en Virginia y sólo las garrapatas adultas de gran tamaño pican a las personas.

²**Brown Dog Ticks (Garrapa marrón del perro):** Estas garrapatas son poco comunes en Virginia y sólo se encuentran en casas de perro, perreras y en las paredes de otros edificios donde viven perros.