



# Your Baby's Hearing Results

(Baby name)

Received a hearing test on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_  
(Date) (Location)

Ear Results Review next page for next steps.

Right Ear ➤  Pass  Pass with Risk  Fail Left Ear ➤  Pass  Pass with Risk  Fail

Date of next appointment (if needed):

Test Type:  OAE  AABR \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_  
(Date) (Location)

Make sure your baby's doctor or health care provider knows the results.

## The 1-3-6 Rule for Your Baby's Hearing Health

If your baby did not pass the newborn hearing screening at the hospital or birthing center, or if your baby has not been screened, [here is some important information you need to know](#).

### Before 1 Month Old

Have your baby screened by a pediatric audiologist or hearing screener. When a baby fails the test, a second screening is recommended. The hospital staff or your pediatrician can help you locate the best place to go for this second screening.

### Before 3 Months Old

If your baby fails their second screening, immediately schedule a hearing evaluation for diagnosis with a pediatric audiologist before your baby is 3 months old.

### Before 6 Months Old

If your baby is diagnosed with a hearing loss begin early intervention services before your baby is 6 months old. Your pediatric audiologist or pediatrician can help you locate your local early intervention office.

### Pass with Risk

Your baby may develop late onset hearing loss, we recommend a complete evaluation by a pediatric audiologist between 12-24 month of age. If you have concerns, please see a pediatric audiologist as soon as possible.

Find a pediatric audiologist—[www.ehdipals.org](http://www.ehdipals.org)

## Milestones in Your Baby's Hearing and Speech Development

Don't Wait: Language Begins at Birth!

### Birth to 3 Months Old

- ▶ Blinks or jumps when there is a sudden, loud noise
- ▶ Quiets or smiles when spoken to
- ▶ Makes sounds like "ohh" or "ahh"

### 6 to 9 Months Old

- ▶ Turns head toward sounds
- ▶ Understands "no-no" or "bye-bye"
- ▶ Makes babbling sounds ("baba," "mama," "gaga")

### 3 to 6 Months Old

- ▶ Looks for sound with eyes
- ▶ Recognizes parent's voice
- ▶ Uses many sounds, squeals and chuckles

### 9 to 12 Months Old

- ▶ Repeats simple words and sounds
- ▶ Correctly uses "mama" or "dada"
- ▶ Responds to singing or music
- ▶ Points to favorite toys and objects when asked

### For more information:

Call 1-866-493-1090

or TTY users dial 7-1-1 for Virginia Relay

[VDHLiveWell.com/hearing](http://VDHLiveWell.com/hearing)

**Virginia  
Early Hearing  
Detection and Intervention**

**VDH** VIRGINIA  
DEPARTMENT  
OF HEALTH

VDHLiveWell

NS10 | 6-2018



## Resultados de audición de su bebé

(Nombre del bebé)

Se le realizó una prueba de audición el \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_  
(fecha) (lugar)

**Resultados de oído** Revise la siguiente página para ver los próximos pasos.

Oído derecho ►  Aprobado  Aprobado con riesgo  Desaprobado Oído izquierdo ►  Aprobado  Aprobado con riesgo  Desaprobado

Tipo de prueba: ►  Otoemisiones acústicas  Respuesta auditiva del tronco encefálico

Fecha de la próxima cita (si es necesaria): \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_  
(fecha) (lugar)

Asegúrese de que el médico o el proveedor de atención médica del bebé conozca los resultados.

## La Regla 1-3-6 de la salud auditiva de su bebé

Si su bebé no aprobó la prueba de audición de recién nacido en el hospital o centro de nacimiento, o si su bebé aún no ha sido evaluado, **hay información importante que debe conocer para que pueda hacer lo mejor para su hijo.**

### Antes del mes de vida

Permita que un audiólogo pediátrico o un evaluador de la audición evalúe a su bebé. Cuando un bebé desaprueba una prueba, se recomienda una segunda evaluación. El personal del hospital o el pediatra pueden ayudarle a encontrar el mejor lugar para esta segunda evaluación.

### Antes de los 3 meses de vida

Si su bebé desaprueba la segunda evaluación, programe de inmediato una evaluación auditiva para obtener un diagnóstico con un audiólogo pediátrico antes de que su bebé cumpla los 3 meses de vida.

### Antes de los 6 meses de vida

Si se le diagnostica a su bebé pérdida de la audición, comience con los servicios de intervención temprana antes de que su bebé cumpla los 6 meses de vida. El audiólogo pediátrico o el pediatra pueden ayudarle a encontrar un consultorio de intervención temprana local.

### Aprobado con riesgo

Su bebé puede desarrollar pérdida auditiva tardía. Recomendamos una evaluación completa por un audiólogo pediátrico entre los 12 y los 24 meses. Si tiene alguna inquietud, consulte a un audiólogo pediátrico lo antes posible.

Encuentre un audiólogo pediátrico: [www.ehdipals.org](http://www.ehdipals.org)

## Hitos en la audición y el desarrollo del habla de su bebé

No espere: ¡el desarrollo del habla comienza al nacer!

### Desde el nacimiento hasta los 3 meses de vida

- ▶ Parpadea o salta cuando hay un ruido repentino y fuerte
- ▶ Se calla o sonríe cuando se le habla
- ▶ Hace ruidos como "ohh" o "ahh"

### Desde los 6 meses hasta los 9 meses de vida

- ▶ Gira la cabeza hacia la fuente del ruido
- ▶ Comprende "no, no" o "chau, chau"
- ▶ Balbucea ("babá", "mama", "gaga")

### Desde los 3 meses hasta los 6 meses de vida

- ▶ Busca la fuente del ruido con los ojos
- ▶ Reconoce la voz de los padres
- ▶ Utiliza muchos sonidos, chilla o se ríe para sí

### Desde los 9 meses hasta los 12 meses de vida

- ▶ Repite palabras simples y sonidos que usted haga
- ▶ Utiliza correctamente "mami" o "papi"
- ▶ Responde al canto o a la música
- ▶ Señala sus juguetes u objetos preferidos cuando se le pregunta

### Para obtener más información:

Llame al 1-866-493-1090  
o los usuarios de TTY marquen  
7-1-1 para Virginia Relay  
[VDHLiveWell.com/hearing](http://VDHLiveWell.com/hearing)

**Virginia  
Early Hearing  
Detection and Intervention**

**VDH** VIRGINIA  
DEPARTMENT  
OF HEALTH